

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 17-4-74 738637

**BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## EDITION DE LA STATION POITOU-CHARENTES

CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SEVRES, VIENNE

12, rue Victor Hugo - 86 - POITIERS - Tél: (49) 41.35.55 -

### ABONNEMENT ANNUEL 25 F.

C. C. P. LIMOGES 4.752.22.W.  
Sous Régisseur de recettes et d'avances  
AVERTISSEMENTS AGRICOLES  
12, rue Victor Hugo - 86 - POITIERS

Nouvelle Adresse : Tél. provisoire : 40-55-55

Abonnement Annuel: 30 F.

"La Fenêtre Nord" Rte de Vasles BIARD 86000 POITIERS  
BULLETIN n° 10 - AVRIL 1974

POIRIER - POMMIER

#### TAVELURES

Les projections d'ascospores, responsables des contaminations primaires, seront importantes lors des prochaines pluies. En outre l'accroissement rapide de la végétation accélère le décroissement de la protection des arbres.

En conséquence il est recommandé d'effectuer un nouveau traitement fongicide dès la fin de la présente semaine sur les arbres traités avant le 7 et au début de la semaine prochaine pour ceux traités depuis.

#### CHENILLES DEFOLIATRICES - PUCERONS

Dans le cas où il est nécessaire d'intervenir contre ces ravageurs ajouter un insecticide à la bouillie destinée à lutter contre la tavelure, ou faire un traitement séparé (cf. bulletin n° 8).

Pour le choix du produit tenir compte de la protection des abeilles si les arbres à traiter sont en fleurs ou si la culture présente des herbes en fleurs visitées par les abeilles.

TETRANYQUES (araignées rouges) Attendre un prochain avis de la Station

VIGNE

EXCORIOSE Se reporter au bulletin n° 8.

CERISIER - PRUNIER

#### MONILIOSE

Pour prévenir les dégâts de cette maladie effectuer dès la défloraison une pulvérisation avec l'un des produits suivants :

bénomyl .....	30 g.M.A./Hl
folpel .....	100 g.M.A./Hl
méthylthiophanate ....	70 g.M.A./Hl

mancozèbe .....	160 g.M.A./Hl
thirame .....	200 g.M.A./Hl

FRAISIER

#### BOTRYTIS (Pourriture grise)

Nous rappelons que contre le Botrytis, 3 traitements doivent être exécutés :

- |  |  |
|--|--|
| - le premier au stade D (boutons blancs) | } avec l'un des fongicides ci-dessous: |
| - le second en cours de floraison        |  |
| - le troisième en fin de floraison       |  |
- benomyl (600 g. de Benlate par ha) - dichlofluanide (2500 g. d'Euparène par ha) -  
- méthylthiophanate (1 Kg de Pelt 44 par ha).

Le Chef de la Circonscription  
Phytosanitaire "Poitou-Charentes"

F. BARBOTIN

Les Ingénieurs chargés  
des AVERTISSEMENTS AGRICOLES

A. GRAVAUD  
R. HUDE  
B. MORIN

Inprimé à la Station le 11 Avril 1974 - Préc. Note : Bull. n° 9 - AVRIL 1974